

factsheet

Natuurwetgeving

Sinds het in werking treden van de Wet natuurbescherming per 1 januari 2017 is de Bruine eikenpage beschermd.


Bruine eikenpage

Verspreiding

Bruine eikenpage komt verspreid voor in de omgeving van kleine, lage eikjes die in de schaduw van hogere bomen staan op de hogere, arme zandgronden in het binnenland, de duinen en Zuid-Limburg. Tot omstreeks 2010 was deze vlinder nog in Boswachterij Staphorst aanwezig. Oudere waarnemingen zijn ook bekend uit Oost-Twente, Sallandse Heuvelrug en bij Zuidwolde.


Recent is Bruine eikenpage in Midden- en Oost-Nederland alleen ten zuiden van Nijmegen waargenomen.

Bruine eikenpage in rusttoestand.
Foto: Marian Schut, Apeldoorn





De vlinders besteden relatief veel tijd aan nectar drinken op Braam, Wilde liguster, Vuilboom, Jacobskruid en Koninginnenkruid.



Kaartbron: NDDF (2017)

Kenmerken

De grondkleur van de bovenkant van de vleugels is donkerbruin; bij het vrouwtje bevindt zich op de voorvleugel een oranje vlek die bij het mannetje ontbreekt. Over de onderkant van de achtervleugel loopt een dunne rij kleine witte vlekjes. De rode maanvlekjes langs de achterrand van de onderkant van de achtervleugel zijn aan beide zijden zwart gerand. De achtervleugel heeft een klein staartje; soms bevindt zich bij het staartje een blauwe vlek.

Inventarisatie

Bruine eikenpage is afhankelijk voor de ei-afzet en de rupsen van jonge, slecht groeiende (zomer) eikjes langs zonnige bosranden. Daarnaast moet voldoende nectar van bijvoorbeeld bloeiende braamstruiken aanwezig zijn.

De vlinder vliegt in één generatie van half juni tot begin augustus. De vlinders besteden relatief veel

tijd aan nectar drinken op Braam, Wilde liguster, Vuilboom, Jacobskruid en Koninginnenkruid. Op dergelijke plaatsen zijn vlinders moeilijk waar te nemen vanwege hun bruine schutkleur en het feit dat ze lang stilzitten.

De hoogste trefkans is het zoeken naar beige eitjes in herfst en winter op takken van kleine kwijnende eikjes met een lengte van 30 tot 150 centimeter. Eitjes worden gevonden langs de stam en onderste takken op een hoogte van enkele centimeters boven de grond tot 60 centimeter.

Behoud en beheer

Het is belangrijk om lage zomereikjes die als voortplantingslocatie worden gebruikt te ontzien bij maai- en kapwerkzaamheden. Gefaseerd afzetten van struweel, bosranden en houtwallen met Zomereik maakt dat er altijd eiken van verschillende leeftijd aanwezig zijn en daarmee geschikt biotoop voor Bruine eikenpage.

Wat te doen bij beschadigen of vernietigen van voortplantingsplaatsen

Als beplanting met eitjes van Bruine eikenpage door ingrepen of ruimtelijke ontwikkelingen verdwijnen, is het verplanten van eikjes met eitjes in het winterseizoen een optie. Ook kunnen takken met eitjes worden afgeknipt en in een te behouden zomereikje worden geplaatst, zodat de rups in het voorjaar het boompje in kan kruipen voor voedsel.

Voor dergelijke handelingen is het aanvragen van een ontheffing Wet natuurbescherming aan de orde. Ecogroen kan u helpen bij het indienen van een dergelijke aanvraag en het opstellen van een projectplan. Ook kunnen wij de ecologische begeleiding in het veld organiseren.

> Meer informatie?

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met:

Martin Heinen

Adviseur ecologie

☎ (06) 288 854 30

✉ m.heinen@ecogroen.nl



**eco
groen**

advies & ingenieursbureau

Emmastraat 16
8011 AG Zwolle

T (038) 423 64 64
E info@ecogroen.nl
I www.ecogroen.nl